

Préparation CB : Algèbre Linéaire

Partie A : Rang d'un endomorphisme (Les Classics)

Soient E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimensions finie, et $u, v : E \rightarrow E$ linéaires.

- ①
 - a** Montrer que $\text{Im}(u + v) \subset \text{Im}(u) + \text{Im}(v)$.
 - b** En déduire que $\text{rg}(u + v) \leq \text{rg}(u) + \text{rg}(v)$.
 - c** Montrer que $\text{Im}(u) \cap \text{Im}(v) = \{0_E\} \implies \ker(u + v) = \ker u \cap \ker v$.
 - d** En déduire que $\text{rg}(u + v) = \text{rg}(u) + \text{rg}(v) \iff \begin{cases} \text{Im}(u) \cap \text{Im}(v) = \{0_F\} \\ \ker(u) + \ker(v) = E \end{cases}$
- ②
 - a** Montrer que $|\text{rg}(u) - \text{rg}(v)| \leq \text{rg}(u + v)$.
 - b** Montrer que $\begin{cases} \text{Im}(u + v) \cap \text{Im}(v) = \{0_F\} \\ \ker(u + v) + \ker(v) = E \end{cases} \implies \begin{cases} \text{Im}(v) \subset \text{Im}(u) \\ \ker(u) \subset \ker(v) \end{cases}$
 - c** En déduire que $\text{rg}(u + v) = \text{rg}(u) - \text{rg}(v) \implies \begin{cases} \text{Im}(v) \subset \text{Im}(u) \\ \ker(u) \subset \ker(v) \end{cases}$.
 - d** En déduire une condition nécessaire pour avoir $|\text{rg}(u) - \text{rg}(v)| = \text{rg}(u + v)$.
- ③ On suppose que $\text{Im}(u) + \text{Im}(v) = \ker(u) + \ker(v) = E$.
Montrer que les deux sommes sont directes.
- ④ On suppose que : $u \circ v = 0, \quad u + v \in GL(E)$.
Montrer que $\text{rg}(u) + \text{rg}(v) = \dim E$.
- ⑤ On suppose que $u^3 = 0$.
 - a** Montrer que $\text{rg}(u) + \text{rg}(u^2) \leq \dim(E)$.
 - b** Montrer que $2\text{rg}(u^2) \leq \text{rg}(u)$.
Indication : On pourra appliquer le théorème du rang à $u|_{\text{Im}(u)}$.
- ⑥ **a** Montrer que $\dim \ker(u \circ v) \leq \dim \ker(u) + \dim \ker(v)$.

Indication : On pourra appliquer le théorème du rang à $u|_{\text{Im}(v)}$.

b Montrer que $\dim(\text{Im}(u) \cap \ker(v)) = \text{rg}(u) - \text{rg}(v \circ u)$.

Indication : On pourra appliquer le théorème du rang à $v|_{\text{Im}(u)}$.

c Montrer que $\text{rg}(u) + \text{rg}(v) - \dim E \leq \text{rg}(u \circ v) \leq \min(\text{rg}(u), \text{rg}(v))$.

Partie B : Projecteurs (Les Classics)

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev et p, q deux projecteur de E .

- ① Montrer que $\text{rg}(p) = \text{Tr}(p)$.
- ② Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Montrer que $u \circ p = p \circ u \iff \ker p$ et Im sont stables par u .
- ③ On suppose que $\ker p = \ker q$. Soit $\lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0, 1\}$.
 - a** Montrer que $q \circ p = q$ et $p \circ q = p$
 - b** En déduire que $r = \lambda p + (1 - \lambda)q$ est un projecteur.
 - c** Vérifier que $\ker(r) = \ker(p)$ et que $\text{Im}(r) \subset \text{Im}(p) + \text{Im}(q)$.
 - d** Donner une CNS pour avoir $\text{Im}(r) = \text{Im}(p) + \text{Im}(q)$. Que peut-on conclure.
- ④ Montrer que : $p \circ q = q \iff \text{Im}(q) \subset \text{Im}(p)$.
- ⑤ Montrer que : $p + q$ est un projecteur $\iff p \circ q = 0, q \circ p = 0$,
et que dans ce cas : $\text{Im}(p) \cap \text{Im}(q) = \{0_E\}, \ker(p + q) = \ker p \cap \ker q$
- ⑥ Soit $f, g \in \mathcal{L}(E)$ tels que $f \circ g = \text{id}_E$.
Montrer que $g \circ f$ est une projecteur et que : $\text{Im}(g \circ f) = \text{Im}(g)$ et $\ker(g \circ f) = \ker(f)$.

Fin

Corrigé

Partie A : Rang d'un endomorphisme (Les Classics)

① **a** Soit $y \in \text{Im}(u + v)$. Il existe $x \in E$ tel que $y = (u + v)(x) = u(x) + v(x)$.
Comme $u(x) \in \text{Im}(u)$ et $v(x) \in \text{Im}(v)$, on a $y \in \text{Im}(u) + \text{Im}(v)$.

b De l'inclusion précédente, on déduit :

$$\begin{aligned} \text{rg}(u + v) &= \dim(\text{Im}(u + v)) \\ &\leq \dim(\text{Im}(u) + \text{Im}(v)) \\ &= \dim(\text{Im}(u)) + \dim(\text{Im}(v)) - \dim(\text{Im}(u) \cap \text{Im}(v)) \\ &\leq \dim(\text{Im}(u)) + \dim(\text{Im}(v)) \\ &= \text{rg}(u) + \text{rg}(v) \end{aligned}$$

c  L'inclusion $\ker u \cap \ker v \subset \ker(u + v)$ est toujours vraie.
En effet : si $x \in \ker u \cap \ker v$, alors $(u + v)(x) = u(x) + v(x) = 0 + 0 = 0$.

 Réciproquement, soit $x \in \ker(u + v)$. Alors $u(x) + v(x) = 0_F$,
d'où $u(x) = -v(x)$. Ainsi $u(x) \in \text{Im}(u)$ et $u(x) = -v(x) \in \text{Im}(v)$, donc
 $u(x) \in \text{Im}(u) \cap \text{Im}(v) = \{0_F\}$. Ainsi, $u(x) = 0_F$ et $v(x) = -u(x) = 0_F$, ce qui
prouve que $x \in \ker u \cap \ker v$.

d  **Sens direct** ($\implies$) : Selon la démonstration de la question 1.b) si on a
 $\text{rg}(u + v) = \text{rg}(u) + \text{rg}(v)$, alors $\text{Im}(u) \cap \text{Im}(v) = \{0_F\}$.
Puisque $\text{Im}(u) \cap \text{Im}(v) = \{0_F\}$, d'après la question 1.c,
on sait que : $\ker(u + v) = \ker(u) \cap \ker(v)$.

D'autre part :

$$\begin{aligned} \dim E &= \text{rg}(u + v) + \dim(\ker(u + v)) \\ &= (\dim E - \dim \ker u) + (\dim E - \dim \ker v) + \dim(\ker u \cap \ker v) \\ &= 2 \dim E - (\dim \ker u + \dim \ker v - \dim(\ker u \cap \ker v)) \\ &= 2 \dim E - \dim(\ker u + \ker v) \end{aligned}$$

Ainsi $\dim E = \dim(\ker u + \ker v)$ avec $(\ker u + \ker v) \subset E$ (en dimension finie),
d'où l'égalité.

 **Sens réciproque** ($\Leftarrow$) : Comme $\text{Im}(u) \cap \text{Im}(v) = \{0_F\}$, d'après la question
1.c, on a : $\ker(u + v) = \ker(u) \cap \ker(v)$. Or $E = \ker u + \ker v$
Donc : $\dim E = \dim(\ker u + \ker v) = \dim \ker u + \dim \ker v - \dim(\ker u \cap \ker v)$.
Donc $\dim E = \dim \ker u + \dim \ker v - \dim \ker(u + v)$.
Donc $\dim \ker(u + v) = \dim \ker u + \dim \ker v - \dim E$

Finalement :

$$\begin{aligned} \text{rg}(u + v) &= \dim E - \dim \ker(u + v) \\ &= \dim E - (\dim \ker u + \dim \ker v - \dim E) \\ &= 2 \dim E - \dim \ker u - \dim \ker v \\ &= (\dim E - \dim \ker u) + (\dim E - \dim \ker v) \\ &= \text{rg}(u) + \text{rg}(v) \end{aligned}$$

② **a** En écrivant $u = (u + v) + (-v)$, la sous-additivité du rang donne :

$$\text{rg}(u) \leq \text{rg}(u + v) + \text{rg}(-v) = \text{rg}(u + v) + \text{rg}(v) \implies \text{rg}(u) - \text{rg}(v) \leq \text{rg}(u + v)$$

Par symétrie des rôles de u et v , on obtient $|\text{rg}(u) - \text{rg}(v)| \leq \text{rg}(u + v)$.

b  **Montrons** $\ker(u) \subset \ker(v)$:

Soit $x \in \ker(u)$, c'est-à-dire $u(x) = 0_F$, donc $(u + v)(x) = v(x)$. Ainsi,
 $v(x) \in \text{Im}(u + v)$, donc $v(x) \in \text{Im}(u + v) \cap \text{Im}(v) = \{0_F\}$. Ceci prouve que
 $x \in \ker(v)$, d'où $\ker(u) \subset \ker(v)$.

 **Montrons que** $\text{Im}(v) \subset \text{Im}(u)$

Soit $y \in \text{Im}(v)$, donc il existe $z \in E$ tel que $y = v(z)$. Comme $\ker(u + v) + \ker(v) = E$, on peut décomposer z sous la forme : $z = x_1 + x_2$ avec $x_1 \in \ker(u + v)$ et $x_2 \in \ker(v)$. Ainsi $y = v(z) = v(x_1 + x_2) = v(x_1) + v(x_2) = v(x_1) + 0_F = v(x_1)$. Or $x_1 \in \ker(u + v)$, donc $(u + v)(x_1) = 0_F \implies u(x_1) + v(x_1) = 0_F \implies v(x_1) = -u(x_1)$. On en déduit que : $y = -u(x_1) = u(-x_1)$, ceci montre que $y \in \text{Im}(u)$. Ceci prouve que $\text{Im}(v) \subset \text{Im}(u)$.

c Posons $w = -v$ et notons que $\ker w = \ker v$, $\text{Im} w = \text{Im} v$ et $\text{rg} w = \text{rg} v$. Ainsi

$$\operatorname{rg}(u+v) = \operatorname{rg}(u) - \operatorname{rg}(v) \Leftrightarrow \operatorname{rg}(u+v+w) = \operatorname{rg}(u+v) + \operatorname{rg}(w)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \operatorname{Im}(v) \cap \operatorname{Im}(u+v) = \{0_F\}, \\ \ker(v) + \ker(u+v) = E \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \operatorname{Im}(v) \subset \operatorname{Im}(u) \\ \ker(u) \subset \ker(v) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{[d]} \quad \operatorname{rg}(u+v) = |\operatorname{rg}(u) - \operatorname{rg}(v)| &\Leftrightarrow \operatorname{rg}(u+v) = \pm(\operatorname{rg}(u) - \operatorname{rg}(v)) \\ &\Rightarrow \begin{cases} \operatorname{Im}(v) \subset \operatorname{Im}(u) \\ \ker(u) \subset \ker(v) \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} \operatorname{Im}(u) \subset \operatorname{Im}(v) \\ \ker(v) \subset \ker(u) \end{cases} \end{aligned}$$

③ On a : $\dim(\operatorname{Im}(u)) + \dim(\operatorname{Im}(v)) - \dim(\operatorname{Im}(u) \cap \operatorname{Im}(v)) = \dim E$ et $\dim(\ker u) + \dim(\ker v) - \dim(\ker u \cap \ker v) = \dim E$.
En faisant la somme et en appliquant le théorème du rang à u et v , on obtient $\dim(\operatorname{Im}(u) \cap \operatorname{Im}(v)) + \dim(\ker u \cap \ker v) = 0$, donc les deux intersections sont réduites au sous-espace nul.

④ Puisque $u \circ v = 0$, $\operatorname{Im}(v) \subset \ker u$. Ainsi $\operatorname{rg}(v) \leq \dim \ker u = \dim E - \operatorname{rg}(u)$, d'où $\operatorname{rg}(u) + \operatorname{rg}(v) \leq \dim E$.
D'autre part, $u+v$ étant inversible, $\dim E = \operatorname{rg}(u+v) \leq \operatorname{rg}(u) + \operatorname{rg}(v)$. On en déduit l'égalité.

⑤ [a] Puisque $u \circ u^2 = u^3 = 0$, on a $\operatorname{Im}(u^2) \subset \ker u$.
Donc $\operatorname{rg}(u^2) \leq \dim \ker u = \dim E - \operatorname{rg}(u)$.

[b] Sachant que $\operatorname{Im}(u|_{\operatorname{Im}(u)}) = u(\operatorname{Im}(u)) = \operatorname{Im}(u^2)$, le théorème du rang appliqué à la restriction $u|_{\operatorname{Im}(u)} : \operatorname{Im}(u) \rightarrow E$ donne :
 $\dim(\operatorname{Im}(u)) = \dim(\operatorname{Im}(u^2)) + \dim(\ker u \cap \operatorname{Im}(u))$.
Donc $\operatorname{rg}(u) = \operatorname{rg}(u^2) + \dim(\ker u \cap \operatorname{Im}(u))$.
Comme $u^3 = 0$, on a $\operatorname{Im}(u^2) \subset \ker u$, or $\operatorname{Im}(u^2) \subset \operatorname{Im} u$ d'où $\operatorname{Im}(u^2) \subset \ker u \cap \operatorname{Im} u$, ainsi $\operatorname{rg}(u^2) \leq \dim(\ker u \cap \operatorname{Im}(u))$, ce qui donne $\operatorname{rg}(u) \geq 2\operatorname{rg}(u^2)$.

⑥ [a] Sachant que $\operatorname{Im}(v|_{\ker(u \circ v)}) = v(\ker(u \circ v)) \subset \ker u \cap \operatorname{Im} v$ et que $\ker(v|_{\ker(u \circ v)}) = \ker v \cap \ker(u \circ v) = \ker v$.
En appliquant le théorème du rang à $v|_{\ker(u \circ v)} : \ker(u \circ v) \rightarrow E$, on obtient :
 $\dim \ker(u \circ v) = \dim \ker v + \dim(\ker u \cap \operatorname{Im}(v)) \leq \dim \ker v + \dim \ker u$.

[b] Sachant que $\operatorname{Im}(v|_{\operatorname{Im}(u)}) = v(\operatorname{Im}(u)) = \operatorname{Im}(v \circ u)$. Appliquons le théorème du rang à la restriction $v|_{\operatorname{Im}(u)} : \operatorname{Im}(u) \rightarrow E$, d'où $\dim \operatorname{Im}(u) = \dim \operatorname{Im}(v \circ u) + \dim(\ker v \cap \operatorname{Im}(u))$, d'où le résultat.

③ D'après la question 6.a) et grâce à la formule du rang, on peut conclure que $\dim E - \operatorname{rg}(u \circ v) \leq \dim E - \operatorname{rg}(u) + \dim E - \operatorname{rg}(v)$, d'où $\operatorname{rg}(u) + \operatorname{rg}(v) - \dim E \leq \operatorname{rg}(u \circ v)$.
D'après la question 6.b), on peut conclure que $\operatorname{rg}(v \circ u) \leq \operatorname{rg}(u)$, donc $\operatorname{rg}(u \circ v) \leq \operatorname{rg}(v)$, or $\operatorname{Im}(u \circ v) = u(\operatorname{Im}(v)) \subset u(E) = \operatorname{Im}(u)$.
Donc : $\operatorname{rg}(u \circ v) = \dim \operatorname{Im}(u \circ v) \leq \dim \operatorname{Im}(u) = \operatorname{rg}(u)$.
Ainsi $\operatorname{rg}(u \circ v) \leq \min(\operatorname{rg}(u), \operatorname{rg}(v))$.
Finalement : $\operatorname{rg}(u) + \operatorname{rg}(v) - \dim E \leq \operatorname{rg}(u \circ v) \leq \min(\operatorname{rg}(u), \operatorname{rg}(v))$.

Partie B : Projecteurs (Les Classics)

① Soit $\mathcal{B} = \mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_2$ une base adaptée à la somme directe $E = \operatorname{Im}(p) \oplus \ker(p)$.

☞ Pour tout $x \in \mathcal{B}_1$, on a : $p(x) = x$,

☞ Pour tout $x \in \mathcal{B}_2$, on a : $p(x) = 0_E$.

Ainsi $\mathcal{M}_{\mathcal{B}}(p)$ est diagonale, formée de $r = \dim \operatorname{Im}(p) = \operatorname{rg}(p)$ fois le nombre 1 et de $\dim E - r$ fois le nombre 0. Sa trace vaut donc $r = \operatorname{rg}(p)$.

② ☞ ($\Rightarrow$) Si $u \circ p = p \circ u$:

$$\begin{aligned} x \in \operatorname{Im}(p) &\Rightarrow p(x) = x \\ &\Rightarrow u(x) = u(p(x)) = p(u(x)) \in \operatorname{Im}(p) \end{aligned}$$

$$\text{Et } x \in \ker p \Rightarrow p(x) = 0 \Rightarrow p(u(x)) = u(p(x)) = 0 \Rightarrow u(x) \in \ker p.$$

☞ ($\Leftarrow$) Réciproquement, tout $x \in E$ s'écrit $x = y + z$ avec $y \in \operatorname{Im}(p)$ et $z \in \ker p$.

$$\text{Par stabilité, } u(y) \in \operatorname{Im}(p) \Rightarrow p(u(y)) = u(y) = u(p(y))$$

$$\text{et } u(z) \in \ker p \Rightarrow p(u(z)) = 0 = u(p(z)).$$

$$\text{Par linéarité, } p \circ u = u \circ p.$$

③ [a] Pour tout $x \in E$, on a $p(x) - x \in \ker p$, car $p^2(x) = p(x)$. Or $\ker p = \ker q$, donc $p(x) - x \in \ker q$, d'où $q(p(x) - x) = 0_E$, autrement dit $q \circ p(x) = q(x)$ pour tout $x \in E$, ce qui signifie $q \circ p = q$.

D'autre part, comme p et q jouent des rôles symétriques, on conclut que $p \circ q = p$.

[b] Posons $r = \lambda p + (1 - \lambda)q$.

$$\text{On a } r^2 = \lambda^2 p^2 + \lambda(1 - \lambda)p \circ q + (1 - \lambda)\lambda q \circ p + (1 - \lambda)^2 q^2 = r, \text{ car } p^2 = p, q^2 = q, p \circ q = p \text{ et } q \circ p = q.$$

- c** $x \in \ker r \Rightarrow \lambda p(x) + (1 - \lambda)q(x) = 0_E$. Si on applique p à cette relation, sachant que $p^2 = p$ et $p \circ q = p$, on obtient $p(x) = 0_E$. Ainsi $\ker r \subset \ker p$.
Inversement : $x \in \ker p \Rightarrow p(x) = 0_E$, mais aussi $q(x) = 0_E$ (car $\ker p = \ker q$).
Ainsi $p(x) = 0_E \Rightarrow r(x) = 0_E$, d'où l'autre inclusion $\ker r \subset \ker p$.
D'où l'égalité : $\ker r = \ker p$.
- $y \in \text{Im}(r) \Rightarrow \exists x \in E$ tel que $y = r(x) = \lambda p(x) + (1 - \lambda)q(x)$. Donc $p(y) = \lambda p^2(x) + (1 - \lambda)p \circ q(x) = p(x)$ car $\lambda p(x) = p(\lambda x) \in \text{Im}(p)$ et car $(1 - \lambda)q(x) = q((1 - \lambda)x) \in \text{Im}(q)$. Ainsi $\text{Im}(r) \subset \text{Im}(p) + \text{Im}(q)$.
- d** Comme $\text{Im}(r) \subset \text{Im}(p) + \text{Im}(q)$, et comme on est en dimension finie, alors : $\text{Im}(r) = \text{Im}(p) + \text{Im}(q) \Leftrightarrow \dim(\text{Im}(r)) = \dim(\text{Im}(p) + \text{Im}(q))$.
D'autre part $\ker(r) = \ker(p) \Rightarrow \dim(\text{Im}(r)) = \dim(\text{Im}(p))$, d'après la formule du rang.
Ce qui donne :

$$\begin{aligned} \dim \text{Im}(r) &= \dim(\text{Im}(p)) + \dim(\text{Im}(q)) - \dim(\text{Im}(p) \cap \text{Im}(q)) \\ 0 &= \dim(\text{Im}(q)) - \dim(\text{Im}(p) \cap \text{Im}(q)) \\ \dim(\text{Im}(q)) &= \dim(\text{Im}(p) \cap \text{Im}(q)) \\ \text{Im}(q) &= \text{Im}(p) \cap \text{Im}(q) \text{ car } \text{Im}(p) \cap \text{Im}(q) \subset \text{Im}(p) \text{ en dimension finie} \\ \text{Im}(q) &\subset \text{Im}(p) \end{aligned}$$
Ainsi $\text{Im}(r) = \text{Im}(p) + \text{Im}(q) \Leftrightarrow \text{Im}(q) \subset \text{Im}(p)$.
Comme p et q jouent des rôles symétriques, alors aussi $\text{Im}(r) = \text{Im}(p) + \text{Im}(q) \Leftrightarrow \text{Im}(p) \subset \text{Im}(q)$.
Finalement : $\text{Im}(r) = \text{Im}(p) + \text{Im}(q) \Leftrightarrow \text{Im}(p) = \text{Im}(q)$.
Or p et q sont des projecteurs, et on a $\ker(p) = \ker(q)$.
Donc $\text{Im}(r) = \text{Im}(p) + \text{Im}(q) \Leftrightarrow p = q$.
Dans ce cas $r = \lambda p + (1 - \lambda)q = p = q$.

D'après ce qui précède tous les $\lambda p + (1 - \lambda)q$ sont des projecteurs et ils ont tous les mêmes noyaux, indépendamment de la valeur de $\lambda \in [0, 1[$.
Ils auront les mêmes images dans le cas où $p = q$. Dans ce cas, pour tout $\lambda \in [0, 1[$, on a $r = p = q$.

- 4** $(\Rightarrow)$ Si $p \circ q = q$, pour tout $y \in \text{Im}(q)$, $y = q(x) = p(q(x)) \in \text{Im}(p)$.
 $(\Leftarrow)$ Si $\text{Im}(q) \subset \text{Im}(p)$, alors pour tout $x \in E$, $q(x) \in \text{Im}(p)$, donc $p(q(x)) = q(x)$, soit $p \circ q = q$.
- 5** $(p + q)^2 = p + q \Leftrightarrow p^2 + pq + qp + q^2 = p + q \Leftrightarrow pq + qp = 0 \Leftrightarrow pq = -qp$.
En multipliant à gauche puis à droite par p , on obtient $p^2 qp = -pqp^2$, donc $pqp = -pqp$, d'où $pqp = 0$, or $pq = -qp$, donc $qp^2 = 0$, donc $qp = 0$ et aussi $pq = 0$.
Dans ce cas, $x \in \text{Im}(p) \cap \text{Im}(q) \Rightarrow p(x) = q(x) = x$, donc $x = p(x) = p(q(x)) = 0_E$. Ainsi $\text{Im}(p) \cap \text{Im}(q) = \{0_E\}$.
D'autre part : Il est clair que $\ker p \cap \ker q \subset \ker(p + q)$.
Inversement : $x \in \ker(p + q) \Rightarrow p(x) + q(x) = 0_E$, si on applique p à cette relation et vu que $p^2 = 0$ et $pq = 0$, alors $p(x) = 0_E$. De même on obtient $q(x) = 0_E$ si on applique q à la formule précédente, sachant que $q^2 = q$ et que $qp = 0$. Ainsi on a démontré que $\ker(p + q) \subset \ker(p) \cap \ker(q)$.
D'où l'égalité : $\ker(p + q) = \ker(p) \cap \ker(q)$.
- 6** $(g \circ f)^2 = g \circ (f \circ g) \circ f = g \circ \text{id}_E \circ f = g \circ f$, donc $g \circ f$ est un projecteur.
 $\text{Im}(g \circ f) = g(\text{Im} f) \subset g(E) = \text{Im}(g)$.
D'autre part : $\text{Im}(g) = \text{Im}(g \circ f \circ g) = (g \circ f)(\text{Im} g) \subset g \circ f(E) = \text{Im}(g \circ f)$.
 $\ker(g \circ f) = \ker f$ car $f(x) = 0 \Rightarrow (g \circ f)(x) = 0$, et
 $(g \circ f)(x) = 0 \Rightarrow f((g \circ f)(x)) = f(x) = 0$ car $f \circ g = \text{id}_E$.

FiN